NEU!

IB SORTEN VERTRIEBS GMBH

BRENTANO® SOMMERFUTTERGERSTE ZZ

VORTEILE

- **Frühe Abreife**
- **Frühes Ährenschieben für eine schnelle Kornfüllung · Ideal für trockene Standorte**
- **Kürzerer Wuchstyp mit guter Standfestigkeit und Strohstabilität**
- **Gesteigerte Anbausicherheit durch Rrs2- Resistenzgen gegenüber Rhynchosporium secalis**
- **Ausgewogenes Gesundheitsprofil**
- **Hohe Marktwareerträge**
- **Hohe Kornerträge auch im extensiven Anbau**

SORTENEINSTUFUNG		
Ährenschieben	4	**früh** – mittel
Reife	4	**früh** – mittel
Pflanzenlänge	3	kurz
Neigung zu Lager	4	gering – mittel
Halmknicken	4	gering – mittel
Ährenknicken	4	gering – mittel

ERTRAGSEIGENSCHAFTEN | QUALITÄTEN		
Bestandsdichte	8	hoch – sehr hoch
Kornzahl | Ähre	5	mittel
Tausendkorngewicht	6	mittel – hoch
Kornertrag Stufe 1	7	hoch
Kornertrag Stufe 2	7	hoch
Markwarenanteil	7	hoch
Vollgerstenanteil	7	hoch
Hektolitergewicht	4	gering – mittel

KRANKHEITSANFÄLLIGKEIT		
Mehltau	2	**sehr gering** – gering
Netzflecken	5	mittel
Rhynchosporium	3	gering
Ramularia	5	mittel
Zwergrost	4	gering – mittel

Sommergersten reagieren empfindlich auf niedrige pH-Werte und Sauerstoffgehalte. Im Rahmen der Fruchtfolge sowie der Bodenbearbeitung ist damit auf einen guten, standortbezogenen pH-Wert zuachten, der durch eine ausreichende Kalkung und ein gut abgesetztes Saatbeet zu erreichen ist.

Aussaat

- Ideal für **frühe als auch späte Aussaattermine** mit 280-320 Kö./m² (im Mittel)
  - Pro 10 Tage vor dem mittleren Termin können etwa 10 % abgezogen werden
  - Pro 10 Tage nach dem mittleren Termin sollten etwa 10 % zugeschlagen werden

Die Düngung der Sommergerste sollte auf das schnelle Wachstum im Frühjahr und die kurze Vegetationsperiode abgestimmt werden. Eine zügige Bestandesetablierung ist entscheidend. Daher sollte mindestens 60 Prozent des benötigten Stickstoffs bereits zur Aussaat ausgebracht werden.

Düngung

Startgabe	EC 00–13	60 – 80 kg N/ha (inkl. N_{min})
Schossgabe	EC 30–31	30 – 50 kg N/ha (inkl. N_{min})

Aufgrund des schwach entwickelten Wurzelsystems von Sommergerste ist es ratsam, die Grundnährstoffe (P/K/Mg) zusätzlich zum Stickstoff direkt bei der ersten Düngergabe bereitzustellen.

Da Sommergerste wegen ihrer kurzen Vegetationszeit die Entwicklungsstadien sehr schnell durchläuft, kann selbst ein kurzfristiger Nährstoffmangel deutliche Ertragseinbußen verursachen. Deshalb sollte die Mikronährstoffversorgung standardmäßig über eine Blattapplikation abgesichert werden.

Wachstumsregler-Einsatz:

In der Regel ist eine Wachstumsregulierung nicht nötig. Auf Standorten mit hoher N-Nachlieferung empfiehlt sich jedoch eine Gabe zu EC 37/49.

Pflanzenschutz:

Durch das ausgewogene Resistenzpaket ist die standortübliche Fungizidintensität ausreichend.
Der örtliche Warndienst sollte dafür beachtet werden.

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Die Sortenbeschreibung geben Erkenntnisse wieder, die im Rahmen von Wertprüfungen und Versuchen der Züchter gewonnen wurden. Trotz größter Sorgfalt können wir nicht garantieren, dass sich diese Erkenntnisse unter allen Praxisbedingungen bestätigen lassen. Sie können daher nur als Entscheidungshilfe dienen. Stand: November 2025